



BASFOLIAR® BORO SL

Basfoliar® Boro SL es un fertilizante foliar corrector y/o preventivo, formulado como concentrado soluble líquido.

Composición química

Grado equivalente: 0-0 -0 + B	
Boro (B)	133 g/l

Acción en el cultivo

Basfoliar® Boro SL optimiza el crecimiento de raíces y brotes nuevos como también mejora la firmeza de los tejidos. El boro interviene en procesos vinculados a la germinación de granos de polen y al crecimiento del tubo polínico, ayuda a la traslocación del calcio, participando en la formación de pectinas de la pared celular.

Aplicación foliar

Cultivos	Dosis foliar	Dosis suelo	Observaciones
Manzanos y perales	2,5 a 4,5 l/ha	15 a 30 l/ha	Aplicar desde ruptura de yema hasta caída de pétalos. También aplicar en post cosecha con hojas plenamente activas y verdes.
Vid	4,5 a 12 l/ha	10 a 20 l/ha	Aplicar en prefloración.
Carozos	4,5 a 9,5 l/ha	10 a 20 l/ha	Aplicar en pico de crecimiento de primavera y otoño.
Alfalfa, remolacha	4,5 a 9,5 l/ha	10 a 30 l/ha	Aplicar en prefloración.
Maíz, maní	2,5 a 4,5 l/ha	10 a 20 l/ha	Aplicar en prefloración.
Algodón, canola, girasol, trigo	2,5 a 4,5 l/ha	5 a 10 l/ha	Aplicar en prefloración.
Caña de azúcar	2,5 a 4 l/ha	10 a 15 l/ha	Aplicar en prefloración.
Soja	0,4 l/ha	-	2 aplicaciones junto a 0,8 l/ha de Basfoliar Ca SL. La primera al inicio de floración y la segunda 10 a 14 días después.

Para obtener un buen resultado es importante cubrir bien toda la planta.

Aplicaciones al suelo

La dosis depende del contenido de boro al momento de la aplicación:

- En suelos con menos de 0,25 ppm de boro y cultivos sensibles, usar 30 l/ha
- En suelos con 0,25 a 0,5 ppm de boro y cultivos sensibles, usar de 20 a 25 l/ha
- En suelos con 0,5 a 1ppm y cultivos sensibles, usar 10 a 15 l/ha

Compatibilidad y precauciones

Basfoliar® Boro SL es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Igualmente se recomienda efectuar las pruebas de compatibilidad correspondientes. La información contenida en la presente ficha técnica es orientativa. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto, lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero Agrónomo o técnico asesor.

IMPORTANTE

Las aspersiones foliares en cultivos hortícolas de hoja y plantas con frutos en desarrollo (frutales y hortícolas) deben realizarse con mojamiento moderados, agua limpia, regulando el pH final de la solución (Basfoliar® Mg Buffer) y en forma nebulizada, utilizando las pastillas adecuadas, para que el fertilizante asperjado no escurra y seque rápidamente. No efectuar aplicaciones foliares con rocío y/o en días de calor o frío excesivo para evitar posibles daños en hojas y frutos.

Presentación: Bidones de 5 l y 20 l

