



BASFOLIAR® CA LÍQUIDO

Basfoliar® Ca Líquido es un fertilizante foliar complementario, preventivo y/o correctivo específico de alta tecnología, formulado como concentrado soluble líquido a base a materias primas de alta calidad y pureza, con lo que se asegura una excelente disolución en agua y acción por vía foliar. Su uso es indispensable para complementar la nutrición del cultivo en períodos de altos requerimientos nutritivos.

Composición química

Densidad 1,37 Kg/lit	
Calcio (Ca)	13,5% P/P

Acción en el cultivo

Basfoliar® Ca Líquido es un fertilizante con acción directa en el incremento de la firmeza del fruto, aumentando por lo tanto la calidad y las cualidades del mismo en postcosecha. Contrarresta además diversos trastornos fisiológicos, como necrosis en fruto (tomate y pimiento), necrosis en hortalizas de hoja (apio) y bitter pit (manzano), entre otras.

Compatibilidad y precauciones

Cultivo	Dosis por aplic. (l/ha)	Momento de aplicación
Manzanos y perales	5-6	Efectuar varias aplicaciones separadas una de otra por 10 a 15 días a partir de frutos con 2,5 cm hasta inicio de cosecha.
	Baño bins	Efectuar una aplicación en postcosecha durante el baño de los bins utilizando una concentración al 1,3 a 1,4 % (1,3 a 1,4 litros cada 100 litros de agua).
Uvas	6	Efectuar 2 o más aplicaciones tempranas: la primera con bayas de 4 a 5 mm y la segunda 14 días después de la primera.
Olivo	6	Efectuar 2 a 3 aplicaciones separadas una de otra por 10 a 15 días a partir de que el fruto tenga aproximadamente el 30% de su tamaño final.
Durazneros, ciruelos, nectarines	7	Efectuar 2 a 3 aplicaciones separadas una de otra por 10 días a partir de 30 días antes de la cosecha.
Cerezos	7	Efectuar 2 aplicaciones separadas una de otra por 10 a 15 días a partir de 20 a 30 días antes de la cosecha.
Frambuesas, arándanos	6	Efectuar 3 a 4 aplicaciones separadas una de otra por 10 días a partir de frutos con desarrollo intermedio.
Tomate, pimiento	2 a 3,5	Efectuar 5 a 6 aplicaciones separadas una de otra por 15 a 20 días a partir del cuaje del primer ramillete.
Hortalizas en general	1,5 a 3	Efectuar 2 a 3 aplicaciones separadas una de otra por 15 a 20 días a partir de que el cultivo esté en plena fase vegetativa.

Recomendaciones de uso

Basfoliar® Ca Líquido es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común (insecticidas, funguicidas y herbicidas), salvo aquellos que contengan azufre en su formulación. Igualmente se recomienda efectuar las pruebas de compatibilidad correspondientes. La información contenida en la presente ficha es orientativa. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto, lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero Agrónomo o técnico asesor.

**Presentación: Botella de 1 l
Bidón de 5 l y 20 l**

Preparación de la mezcla

Basfoliar® Ca Líquido se adiciona directamente al tanque del equipo pulverizador a medio llenar con agua, se agita y luego se completa a volumen total siempre con agitación permanente. Se debe aplicar con altos volúmenes de agua (1500 l/ha), y con cubrimiento total, especialmente de los frutos.

IMPORTANTE

Las aspersiones foliares, sobre todo en cultivos hortícolas de hoja y en plantas con frutos en desarrollo (frutales y hortícolas), deben realizarse con mojamientos moderados, agua limpia, regulando el pH final de la mezcla (Basfoliar Mg Buffer) y en forma muy nebulizada, utilizando las pastillas adecuadas, para que el fertilizante asperjado no escurra y seque rápidamente. No efectuar aplicaciones foliares con rocío y/o en días de calor o frío excesivo para evitar posibles daños en hojas y frutos.