



FICHA TÉCNICA

TOPSIN M-70%WP

TOPSIN M-70%WP es un fungicida curativo y preventivo de acción sistémica, con prolongado efecto residual, eficaz para controlar pudriciones de frutos en cultivos como: tomate, fresa, tomate de árbol, maracuyá y también eficaz para control de enfermedades ocasionadas por hongos de suelo que producen pudriciones de la base del tallo y raíz en diferentes cultivos.

INGREDIENTE ACTIVO	Metil tiofanato
FORMULACIÓN	Polvo Mojable en agua (WP)
CONCENTRACIÓN	700 g/kg.
MODO DE ACCIÓN	Sistémico

VENTAJAS:

- Posee una combinación única de acción preventiva, curativa y propiedades fungicidas sistémicas.
- Posee un amplio espectro de acción en varias enfermedades.
- No presenta fito toxicidad en los cultivos.
- Muestra un efecto residual prolongado, debido a que es estable en condiciones de sol y lluvia.

TOXICOLOGÍA:

Categoría toxicológica IV.

DL50 Oral: 7 500 mg/kg (ratas).

DL50 Dérmica: >10 000 mg/kg (ratas).

EUROFERT S.A.

Av. De los Shyris N344 y Av. Eloy Alfaro. Edificio Parque Central Piso 4 Ofic.409
Telf: 3825615-3823873. www.eurofert.com.ec

RECOMENDACIONES:

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	FRECUENCIA
Arroz	Quemazón: <i>Pyricularia oryzae</i>	400-500g	14 días
	Mancha del tallo: <i>Helminthosporium oryzae</i>		
Papa	<i>Rhizotocnia solani</i>	100g/200lt	14 días
	Lanosa: <i>Roselinia sp</i>	100g/200lt	14 días
	Mancha Foliar: <i>Septoria spp</i> , <i>Alternaría solani</i>	100-200g/200lt	14 días
Tomate de Árbol	Ojo de pollo: <i>Collectothricum gloesporoides</i>	200g/200lt	14 días
Hortalizas			
Cebolla-Ajo	Pudriciones: <i>Fusarium spp</i> y <i>Botrytis Sclerotium</i>	100g/200lt	14 días
Lechuga	Pudrición: <i>Botrytis cinérea</i>	100g/200lt	14 días
Cilantro	Mancha Foliar: <i>Septoria spp</i> , <i>Alternaría solani</i>	100-200g/200lt	14 días
Leguminosas			
Haba	Mancha chocolate	100g/200lt	14 días
Frejol	Pudriciones: <i>Fusarium spp</i> y <i>Rhizotocnia</i>	100g/200lt	14 días
Arveja	<i>Ascohyta pisi</i>	100g/200lt	14 días
Tomate	Pudriciones: <i>Fusarium spp</i> y <i>Rhizotocnia</i>	200g/200lt	14 días
	Pudrición del fruto: <i>Botrytis cinérea</i>		
	Manchas foliares: <i>Alternaría Solani</i>		
Cucurbitáceas Melón/Sandía	Oídio: <i>Oídium sp</i>	100g/200lt	14 días
	Moho Blanco: <i>Sclerotina sclerotiorum</i>	100g/200lt	14 días
	Antracnosis: <i>Collectothrichum spp</i>	100g/200lt	14 días
Maracuyá	Antracnosis: <i>Collectothrichum spp</i>	100g/200lt	14 días
	Mancha Parda: <i>Alternaría spp</i>	100g/200lt	

PRESENTACIONES:

Fundas de 100g

Fundas de 200g

Fundas de 400g

MODO DE EMPLEO

EUROFERT S.A.

Av. De los Shyris N344 y Av. Eloy Alfaro. Edificio Parque Central Piso 4 Ofic.409

Telf: 3825615-3823873. www.eurofert.com.ec