

Hoja Técnica

Fecha Actualizada: 02/03/2016

Stroby DF

Fungicida

TIPO	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Kresoxim Methyl
GRUPO QUÍMICO	Estrobirulina
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Gránulos dispersables en agua (WG) que contiene 500 gramos de Kresoxim Methyl por kilo de producto comercial.
MECANISMO DE ACCIÓN	Fungicida de contacto eficaz para combatir enfermedades fungosas producidas por: Ascomicetes, hongos imperfectos y varios Basidiomicetes, en frutales, hortalizas, plantas ornamentales y otros cultivos.
MODO DE ACCIÓN	Stroby DF posee acción protectante al inhibir la germinación de las esporas. Sin embargo, también tiene acción erradicante y curativa, según el patógeno y momento de aplicación. De acuerdo a su mecanismo de acción, Stroby DF inhibe el transporte de electrones en las mitocondrias.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica IV. DL50 Oral: > 5 000 mg/kg (rata) DL50 Dermal: > 4 000 mg/kg (rata)
REGISTRO MAGAP	076 - F - U
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Aplicar el producto cubriendo totalmente la planta. No hacerlo cuando esté por llover. Para evitar un posible riesgo de resistencia, alternarlo con otros fungicidas que posean diverso mecanismo de acción.
COMPATIBILIDAD	Stroby DF es compatible con otros fungicidas como: Aviso DF, Kumulus DF y Polyram DF; con insecticidas como: Perfekthion.
FITOTOXICIDAD	Stroby DF no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

Oficinas Quito:
Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas.
Edificio Previsora, Piso 2
Teléfono: 593 2 397 9500
Fax: 593 4 268 7738Oficinas Guayaquil:
Cdl. Kenedy Norte, Av. Dr. Miguera H. Alcivar
Edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 2, of. 208
Teléfono: 593 4 268 7730
Fax: 593 4 268 7738

PERÍODO DE CARENCIA	N/A
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	24 horas después de la aplicación.
PRESENTACIÓN	600 gramos
® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.	

PRINCIPALES CARACTERISTICAS



Stroby es una mezcla de fungicidas, que combinan a la mejor estrobilurina con la última generación de las carboxamidas. Acción preventiva y curativa.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Problema	Dosis	Frecuencia de aplicación
Ornamentales Rosal Y Otros (<i>Rosa sp.</i>)	Cenicilla (<i>Oidium spp</i>)	0.3 kg/ha	Aplicar de forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas con un volumen de agua desde 1600 l/ha.