

Hoja Técnica

Fecha Actualizada: enero/2023

Fastac[®] Duo

TIPO	Insecticida
INGREDIENTE ACTIVO	Acetamiprid + Alpha cypermethrin
GRUPO QUÍMICO	
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Suspensión concentrada (SC) Acetamiprid 100 g/l Alpha cypermethrin 200 g/l
MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN	Acetamiprid, insecticida sistémico con actividad translaminar con actividad de contacto y acción estomacal. Antagonista del receptor acetilcolina (nAChR). Alpha cypermethrin es un insecticida para el control de insectos mordedores y chupadores en un rango amplio de cultivos, con acción de contacto y estomacal. Modulador del canal de sodio.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso. DL50 Oral: >2000 mg/kg (rata) DL50 Dermal: > 4000 mg/kg (rata) DL50 inhalación: > 2.7 mg/l
REGISTRO	213-I1/NA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Para preparar el caldo de fumigación se recomienda seguir los siguientes pasos: Colocar la dosis de producto a usar, en un recipiente con la mitad de agua, agitar durante 2 minutos aproximadamente. Verter el 50% final del volumen de agua faltante al caldo de fumigación y agitar durante 2 minutos más. Finalmente agregar el caldo de fumigación al equipo de aplicación, previamente calibrado.

COMPATIBILIDAD	Fastac® Duo es compatible con otros productos agroquímicos, se recomienda realizar una prueba a pequeña escala previo al uso del producto en el cultivo.
FITOTOXICIDAD	El producto no es fitotóxico si se usa de acuerdo con la dosis recomendada por el formulador en la etiqueta.
PERÍODO DE CARENIA	15 días
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	12 horas después de la aplicación.
PRESENTACIÓN	1 Litro
® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.	

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plaga	Dosis	Recomendación
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Minador de la hoja (<i>Hydrellia</i> sp.)	0.5 l/ha	Se recomienda aplicar cuando exista la presencia del 30% de hojas con plagas. Realizar una aplicación de la dosis recomendada.
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.3 l/ha	Se recomienda aplicar cuando exista la presencia del 20% de cogollos dañados en campo, realizar una aplicación de la dosis recomendada. Periodo de reingreso: 12 horas.