

Hoja Técnica


Fecha Actualizada: 10/05/2023

Aviso® Fungicida

TIPO	Fungicida
INGREDIENTE	
ACTIVO	Cymoxanil + Metiram
GRUPO QUÍMICO	Nitrile fungicide + Dithiocarbamato
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Gránulos dispersables en agua (WG) que contiene 4.8 % de Cymoxanil y 57 % de Metiram por kilo de producto comercial.
MECANISMO DE ACCIÓN	Aviso® es un fungicida que combina dos ingredientes activos, uno sistémico y un protectante eficaz para combatir enfermedades oomycetales.
MODO DE ACCIÓN	Cymoxanil penetra al interior de los tejidos de la planta, evita la instalación del patógeno al inhibir la respiración del hongo, la biosíntesis de aminoácidos, la metabolización de uridina y al afectar la permeabilidad celular; también impide que ocurra la enfermedad cuando ésta se encuentra en sus primeras fases del desarrollo. Metiram protege a la planta desde el exterior con múltiples mecanismos de acción, lo cual no permite que el hongo forme resistencia al producto.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso. DL50 Oral: > 2 200 mg/kg (rata) DL50 Dermal: > 2 000 mg/kg (rata)
REGISTRO	74 - F1/NA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Aplicar el producto cubriendo totalmente las plantas. Para preparar la mezcla, verter la cantidad necesaria de Aviso® directamente al tanque conteniendo agua hasta sus % partes. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.
COMPATIBILIDAD	Aviso® es compatible en general con otros plaguicidas y abonos foliares comúnmente usados en la agricultura, excepto con los de Reacción fuertemente alcalina. En todo caso, la

	compatibilidad física de cada mezcla debe ser previamente verificada.
FITOTOXICIDAD	Aviso® no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
PERÍODO DE CARENCIA	N/A
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	12 horas después de la aplicación.
PRESENTACIÓN	Funda x 1.0 kg.
® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.	

PRINCIPALES CARACTERISTICAS



Aviso® es un fungicida, que combinan la acción sistémica del Cymoxanil con la acción protectante de Metiram. Efecto preventivo y curativo.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	Frecuencia de aplicación
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Mildiú (<i>Peronospora sparsa</i>)	1.25 kg/ha	Aplicar de forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas con un volumen de agua desde 1200 l/ha.