

Hoja Técnica

Fecha Actualizada: 13/12/2024

Vivace[®]

Fungicida

TIPO	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Fluxapyroxad + Pyraclostrobin
GRUPO QUÍMICO	Carboxamide + Estrobilurina
FORMULA QUÍMICA	$C_{18}H_{12}F_5N_3O$ + $C_{19}H_{18}ClN_3O_4$
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC) que contiene 167 g de Fluxapyroxad y 333 g de Pyraclostrobin.
MECANISMO DE ACCIÓN	Fluxapyroxad es un Carboxamide de última generación con un elevado nivel de actividad, especial diseño molecular y propiedades únicas de distribución en la planta que le permiten ingresar y distribuirse en el interior fácilmente brindando una acción preventiva y/o curativa y duradera. Pyraclostrobin: es una estrobilurina que posee rapidez de acción, eficacia y amplio espectro de control sobre patógenos. Vivace[®] es un fungicida de efecto preventivo, curativo y erradicante. La base del control de Vivac
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica II. Ligeramente peligroso. DL50 Oral: <2000 mg/kg (rata) DL50 Dermal: > 5000 mg/kg (rata)
PRECAUCIONES	"Nocivo por ingestión" "Causa irritación moderada a los ojos". "Evita contacto con piel y la ropa". No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS
AUXILIOS**

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, No induzca al vómito. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico.
REGISTRO MAGAP	211-F2 / NA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Agitar bien el envase de Vivace® antes de usar. Vivace® debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la bomba con agua hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad. Luego agregar Vivace® con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Completar el depósito con agua.
COMPATIBILIDAD	Vivace® es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común excepto con solventes no polares o aceites. Se recomienda realizar pruebas previas antes de mezclar con cualquier otro producto.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico a la dosis y forma de uso recomendados en la etiqueta
PERÍODO DE CARENIA	7 días para Brócoli y papa
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	24 horas (Brócoli), 4 horas (Papa).
PRESENTACIÓN	1.0 litro
® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.	

RECOMENDACIONES DE USO			
Cultivo	Problema	Dosis	PERIODO DE CARENIA
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>)	Pudrición de la pella (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.40* l/ha	Realizar una aplicación del producto VIVACE, cuando el cultivo se encuentre en fase de desarrollo vegetativo. La aplicación hacerla ante un máximo de 5% de severidad de ataque de la plaga. Realizar una segunda aplicación con un intervalo de 7 días.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Costra negra (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1.50 l/ha	Realizar una aplicación a los tubérculos, en el inicio de la siembra cuando el umbral económico supere el 1% de severidad.