

FULLSTOP ADVANCE

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES EMPRESA FORMULADORA

PILARQUIM (SHANGHAI) CO., LTD.
1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng-Xian District,
Shanghai, R.P. de CHINA
Tel: (86-21) 5758-9888 (25 líneas)
Fax: (86-21) 5758-9666, 5758-8579

TIPO DE PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO COMCENTRACIÓN FORMULACIÓN REGISTRO NACIONAL CATEGORÍA TOXICOLÓGICA INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Herbicida
Glufosinate-ammonium
600 g de i.a/l
Concentrado soluble -SL
13-H33/NA
CATEGORÍA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO-ATENCIÓN
Ligeramente tóxico para aves, y abejas. Nocivo para
organismos acuáticos No persistente en suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERALIDADES

FULLSTOP ADVANCE es un herbicida de contacto no selectivo post emergente de amplio espectro, con alguna acción sistémica.
Se transloca solamente en las hojas, desde la base hacia el ápice.

MODO DE ACCIÓN

Inhibe la glutamino sintetasa, con acumulación de iones hidrógeno, e inhibiendo la fotosíntesis

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo de empleo:

Para su preparación vierta la dosis de **FULLSTOP ADVANCE** en la mitad del volumen total de agua, agite y añada el agua restante hasta completar la cantidad necesaria recomendada de acuerdo con el cultivo.

La aplicación es foliar a las partes aéreas de las malezas cubriendo en forma homogénea todo el follaje. No aplique cuando las condiciones favorezcan la deriva del producto (vientos fuertes) o con equipo de aplicación defectuoso. Use equipo pulverizador bien lavado y calibrado, provisto de un buen sistema de agitación y boquilla de abanico plano. No aplique el producto si se espera lluvias, ni en horas de calor o sol excesivo. No aplicar cuando se observen síntomas de stress hídrico o temperaturas menores a los 10°C. No descargue residuos del producto en fuentes de agua ni en el sistema de alcantarillado. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENIA
Bordes Agrícolas	Saboya (<i>Panicum máximum</i>) Monte de agua (<i>Asystasia gangetica</i>) Achochilla (<i>Momorica charantia</i>) Plumilla (<i>Panicum trichoides</i>) Cainadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	0.4 l/ha *	N/A

*Volumen agua: 200 l/ha de agua

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: aplicar una sola vez, en post emergencia de las malezas de los bordes agrícolas cuando se evidencie la presencia de las malezas con un promedio de 3 hojas verdaderas.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas; en caso de requerir ingresar al cultivo antes de este período, usar equipo de protección personal completo.

COMPATIBILIDAD Y FULLSTOP ADVANCE no es compatible con agentes oxidantes fuertes, productos fuertemente alcalinos o ácidos. En caso de duda, realice una prueba a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: No se observó problemas de fitotoxicidad en plantas cercanas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Causa irritación moderada a los ojos. Cuidado evite el contacto. POSIBLE TERATOGENICO.

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, visor, botas y guantes, durante la manipulación y aplicación. Use mascarilla con filtro apropiado para plaguicidas y overol impermeable. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

MATÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad

CONTACTO CON LOS OJOS Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos manteniendo los párpados abiertos

CONTACTO CON LA PIEL Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón
INGESTIÓN No induzca el vómito. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente

NOTA AL MÉDICO Síntomas: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, Irritación piel, ojos nariz y garganta, dificultad para respirar, taquicardia, convulsiones. No existe un antídoto específico. Trate conforme los síntomas No administrar

atropina.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrole la etiqueta”



EN 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. Para más información dirigirse a: PILARQUIM S.A. Teléfono : +593(02) 3040861 /0992581825 en Quito.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado. La vida de almacenamiento por lo menos 2 años si está almacenado en el recipiente original sin abrir a temperatura ambiente.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No arroje envases vacíos y/o residuos de este producto al campo ríos, lagos, fuentes de agua o sistemas de alcantarillado". "No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas, no aplique cuando este lloviendo, en horas soleadas, ni cuando exista vientos fuertes. " Para aplicación terrestre respete la franja de seguridad de 50 metros (sin barreras vivas) y 30 metros (con barreras vivas) respecto cuerpos hídricos (ríos, estanques, arroyos). Use solo la dosis recomendada y con equipos de aplicación bien calibrados y en buen estado para evitar desperdicios y derrames. En caso de derrame, recoja el producto usando aserrín, arena, o carbón activado, cloque los residuos en un contenedor con etiqueta y tapa, y entregue a un gestor autorizado para disposición final."

Actualizada: 2024-10-07- LC